

## **Impfempfehlung für Katzen**

Gegen diese Infektionen sollten Katzen immer geschützt sein:

Katzenschnupfen, Katzenseuche (= RCP), Tollwut (bei Freigängern)

### **Grundimmunisierung**

Als Grundimmunisierungen von Welpen gelten per Definition alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren.

Im Alter von

8 Lebenswochen: RCP

12 Lebenswochen: RCP, Tollwut bei Freigängern

16 Lebenswochen: RCP, Tollwut bei Freigängern

15 Lebensmonaten: RCP, Tollwut bei Freigängern

Die im Alter von 16 Lebenswochen empfohlene 2. Impfung geht über die gesetzliche Anforderung hinaus, ist aber aus immunologischen Aspekten sinnvoll. Erfolgt die Wiederholung dann im 15. Lebensmonat, ist die Tollwutimpfung (bei Verwendung des entsprechenden Impfstoffs) 4 Jahre gültig!

Erfolgt die erste RCP-Impfung erst ab einem Alter von 12 Lebenswochen ist eine zweimalige Impfung im Abstand von 3 – 4 Wochen, gefolgt von einer weiteren Impfung nach 1 Jahr, für eine erfolgreiche Grundimmunisierung ausreichend.

### **Wiederholungsimpfungen**

Wiederholungsimpfungen sind alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen.

#### **Tollwut:**

In Deutschland gelten die in den Packungsbeilagen der Impfstoffe genannten Wiederholungsimpftermine (maximale Gültigkeit: 4 Jahre).

#### **RCP:**

Für die in Deutschland zugelassenen Kombinationsprodukte sind jährliche Wiederholungsimpfungen empfohlen.

Für die Katzenseuche-Komponente sind Wiederholungsimpfungen im Abstand von 3 Jahren ausreichend, wenn der Impfstoff entsprechend zugelassen wurde.

Für die Katzenschnupfen-Komponente werden Wiederholungsimpfungen im Abstand von 1 Jahr empfohlen. Bei Katzen, die keinem hohen Infektionsdruck ausgesetzt sind (z.B. Wohnungskatzen), ist eine Wiederholungsimpfung der Katzenschnupfenkomponente im Abstand von 2 Jahren ausreichend. Dies gilt nicht für die Tiere die Ausstellungen besuchen!

Zusätzlich können folgende Impfungen sinnvoll sein – hierzu fragen Sie Ihren Tierarzt:

Leukose

Bordetella bronchiseptica

Chlamydien

Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)

Sollen die Katzen hiermit grundimmunisiert werden, so ist eine zweimalige Impfung im Abstand von 3-4 Wochen nötig. Die Impfungen müssen dann jährlich wiederholt werden.